

Reprint: Vår Fuglefauna 4, 242-244.

## Hekkebestanden av teist på to øyer i Troms

SVEIN MYRBERGET

Den norske bestand av teist *Cephus grylle* synes å være i tilbakegang (Myrberget 1978). Dette synes i særlig grad å være tilfelle i områder med mye villmink *Mustela vison* (Røv & Frensen 1980).

Det er imidlertid ved norskekysten utført få eksakte tellinger av teist over en arrekke. Jeg vil derfor her gi noen tall over antall hekkende par teist på to øyer i Tranøy, Troms i 1960-1981, selv om feltarbeidet ikke er utført like grundig hvert år.

### OMRADET

Tranøya (69°09'N - 17°25'E) ligger i

Tranøy kommune og mellom Senja og fastlandet. Selve Tranøya er 127 ha og ca. 2 km lang. Ved øya ligger 5 holmer samt en rekke skjær som er undersøkt

Enkelte år har jeg også registrert teisteparene på ei nærliggende øy, Furuøya (2 km mot NØ), og Lille Furuøy like ved. Furuøya er omkring 1 km lang.

### RESULTATER

På selve Tranøya har teisten hekket på to steder: Tennes på sydsiden og Lykthusnes på vestenden. I 1960 hekket 1 par på Tennes og 2 par på Lykthusnes og på holmene ved Tranøya var det

Pam:598.441: (\*58)

MXR

POLAR PAM 3347

Doc'd: Oct 25/81

Order No.:

Price: Exchange

Doc. No.: Directorate for Wildlife & Freshwater Fish

POLAR  
PAM  
3347